

① 過酸化ベンゾイル（ゲル・ローション）

269 その他の外用薬

改訂箇所	改訂内容						
[11.2 その他の副作用] 一部改訂	<table border="1"> <tr> <th>発現部位</th><th>副作用</th></tr> <tr> <td>皮膚</td><td>皮膚剥脱（鱗屑・落屑）、紅斑、刺激感、乾燥、そう痒、接触皮膚炎（アレルギー性接触皮膚炎を含む）、皮膚炎、湿疹、蕁麻疹、間擦疹、乾皮症、脂腺機能亢進、腫脹、ピリピリ感、灼熱感、汗疹、違和感、皮脂欠乏症、ほてり、浮腫、丘疹、疼痛、水疱、びらん、<u>皮脂欠乏性湿疹</u></td></tr> <tr> <td>その他</td><td>口角炎、眼瞼炎、白血球数減少、白血球数増加、血小板数増加、血中ビリルビン増加、ALT増加、血中コレステロール減少、血中尿素減少、<u>AST増加</u>、<u>呼吸困難感</u></td></tr> </table>	発現部位	副作用	皮膚	皮膚剥脱（鱗屑・落屑）、紅斑、刺激感、乾燥、そう痒、接触皮膚炎（アレルギー性接触皮膚炎を含む）、皮膚炎、湿疹、蕁麻疹、間擦疹、乾皮症、脂腺機能亢進、腫脹、ピリピリ感、灼熱感、汗疹、違和感、皮脂欠乏症、ほてり、浮腫、丘疹、疼痛、水疱、びらん、 <u>皮脂欠乏性湿疹</u>	その他	口角炎、眼瞼炎、白血球数減少、白血球数増加、血小板数増加、血中ビリルビン増加、ALT増加、血中コレステロール減少、血中尿素減少、 <u>AST増加</u> 、 <u>呼吸困難感</u>
発現部位	副作用						
皮膚	皮膚剥脱（鱗屑・落屑）、紅斑、刺激感、乾燥、そう痒、接触皮膚炎（アレルギー性接触皮膚炎を含む）、皮膚炎、湿疹、蕁麻疹、間擦疹、乾皮症、脂腺機能亢進、腫脹、ピリピリ感、灼熱感、汗疹、違和感、皮脂欠乏症、ほてり、浮腫、丘疹、疼痛、水疱、びらん、 <u>皮脂欠乏性湿疹</u>						
その他	口角炎、眼瞼炎、白血球数減少、白血球数増加、血小板数増加、血中ビリルビン増加、ALT増加、血中コレステロール減少、血中尿素減少、 <u>AST増加</u> 、 <u>呼吸困難感</u>						
[14. 適用上の注意] 追記	〔薬剤使用時の注意〕 <u>本剤の有効成分濃度及び用法・用量は、過酸化ベンゾイル5%製剤と異なることに注意すること。</u>						
〈参考〉							
剤形追加承認に伴う改訂							

ベピオゲル

① アモキシシリン水和物

613 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの

改訂箇所		改訂内容		
[10. 2併用注意]	追記			
		薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
		メトトレキサート	メトトレキサートの副作用を増強させるおそれがある。	メトトレキサートの尿細管分泌を阻害し、尿中排泄を低下させると考えられている。
[11. 2その他の副作用]	追記	〈ヘリコバクター・ピロリ感染を除く感染症〉		
		発現部位	副 作 用	
		皮 膚	線状IgA水疱症	
		〈参考〉		
企業報告				

サワシリンカプセル250

以上当院採用薬剤の添付文書改訂がございました、ご確認の上ご注意お願いいたします。

＊＊季節の変わり目、健康管理にご注意ください

